Ich bin in der Lage, einen ähnlichen Fall berichten zu können. (Schluss folgt.)

Die Mollusken der Travemünder Bucht.

(Auszug aus: Die wirbellosen Thiere der Travemünder Bucht.)

Von Heinrich Lenz.

A. Lamellibranchia.

1. Mytilus edulis L., bis 84 Mm. lang.
2. Modiolaria discors L., ziemlich häufig in der Region der rothen Algen.
3. Montacuta bidentata Mtg., selten, im Magen von Platessa vulgaris, bei Niendorf in 10 Faden.
4. Cardium edule L., bis 39 Mm. lang.
5. — fasciatum Mtg., selten.
6. Astarte borealis Chemn. (arctica Gray), in neuerer Zeit mehrfach lebend gefangen.
7. — sulcata da Costa, ebenso.
8. Cyprina islandica L., nicht selten in 10—12 Faden.
9. Tellina baltica L., stellenweise sehr häufig.
10. Scrobicularia piperata Gmel., nicht häufig.
11. — alba Wood, ziemlich häufig, besonders im Magen von Platessa vulgaris.
12. Solen pellucidus Penn., selten.
13. Corbula gibba Olivi, einzeln.
14. Mya arenaria L., reichlich. Mya truncataz wurde nie gefunden.
15. Saxicava rugosa L., selten.
16. Pholas candida L., eine halbe Schale.
17. Teredo navalis L., selten.

B. Opisthobranchia.

18. Aeolis Drummondi Thomps., bis 15 Mm. lang.
19. — rufibranchialis Johnst. 2 Ex.
20. Polycera ocellata Alder et Hancock. 2 Ex.

21. Doris pilosa Müll. 2 Ex.
22. — muricata Müll. 6 Ex.
23. Utriculus obtusus Mtg., nicht selten.
24. — truncatulus Brug., 3 Mm. lang.
25. Odostomia rissoides Hanley, einige Schalen.

C. Prosobranchia.

26. Litorina litorea L., sehr häufig, meist als var. paupercula Jeffr.
27. — obtusata L., weit seltener.
28. — rudis Maton var tenebrosa Mtg., häufig.
29. Lacuna divaricata Fabr., einfarbig, strohfarben, braungebändert, selten einfarbig, rothbraun.
30. — pallidula da Costa, 4 Ex.
31. Rissoa inconspicua Alder, nicht häufig. Jeffreys, dem von unseren Exemplaren vorgelegen haben, zieht dieselben zu der Lovèn'schen Species albella. Nach Vergleichung von typischen Exemplaren von inconspicua Alder und albella Lovèn, welche uns Herr Jeffreys gütigst anvertraut hat, glauben auch wir uns überzeugt halten zu dürfen, dass unsere in Rede stehenden Exemplare mit der R. albella Lovèn übereinstimmen.
32. — octona Nilsson, ziemlich überall bis 4 Faden Tiefe. Wir theilen mit den Herrn Meyer und Möbius und Schwartz von Mohrenstern die Ansicht, dass unsere Art eine ächte Rissoa ist. Herr Jeffreys sieht sie nach ihm vorgelegten Exemplaren als Varietät der R. membranacea an.
33. Hydrobia ulvae Pennant, überall bis 12 Faden Tiefe, bis 5 Mm. lang. — Hydrobia balthica Nilsson betrachtet Jeffreys als eine locale Form der Hydrobia ulvae.
34. — ventrosa Mtg. Unter den Hydrobien der Travemünder Bucht, welche wir Herrn Jeffreys zugeschickt, hat derselbe kürzlich einige Stücke ausgelesen, und als H. ventrosa Mtg. bezeichnet, welche sich durch

geringere Grösse, tiefere Nähte, weit mehr gewölbte Umgänge, mehr kugelig geformte Schlusswindung, weniger spitzen oberen Mündungswinkel, sowie durch das Abstossen der Innenlippe bei ausgewachsenen Stücken und durch eine glasige Schale kennzeichnen.

35. Cerithium reticulatum da Costa, etwa ein Dutzend Exemplare an Steinen.
36. Buccinum undatum L., noch nicht lebend gedrakt.
37. Nassa reticulata L., desgleichen.
38. Fusus (Neptunea) antiquus L., vier Exemplare; das grösste 75 Mm. lang.
39. Neritina fluviatilis var. baltica Nilss. Einzeln auf der Rhede, häufiger im Hafen.

D. Cephalopoda.

40. Loligo breviceps, Steenstr., früher im Archiv der Meckl. Freunde der Naturgesch. 26 p. 104 als L. vulgaris beschrieben, ein Männchen von 30 Ctm. Länge, im Brackwasser der Trave gefangen (auf Taf. 1 abgebildet).

Tausch-Catalog

des Tauschvereins

der deutschen malacozoologischen Gesellschaft.

N. B. Die Preise in Reichsmark per Stück.

Helix	ℳ		ℳ
appressa Say. Ver. St. v.N.-A.	0,40	stenotrema, Raf. V. S. v.N.-A.	0,30
clausa, „ „	0,30	Macrocyclis concava, Say. Ver. St. v. N.-Am.	0,30
coelata, Stud. Dinkelscherben	0,30	Verschiedene der im Catalog vom Decemb. angekündigten Helices etc., die rasch abgingen, sind unterwegs, und können jetzt wieder bestellt werden.	
fallax, Say. Ver. St. v. N.-A.	0,40		
inflecta, Say. „	0,20		
intertexta, Binn. „	0,20		
palliata, Say. „	0,40		
profunda, Say. „	0,20		
Rugeli, Shuttlew. „	0,20		